

МЧС ДНР информирует!



Будьте осторожны при пользовании бытовым газом!

Если у Вас в квартире газовая плита:

- Установку газовой плиты, баллона доверяйте только специалистам;
- Исключите доступ детей к газовой плите;
- На ночь или уходя из дома, перекрывайте кран подачи газа;


Способы обнаружения утечки газа:

- визуально: на поверхности газовых труб, смоченных мыльным раствором, в месте утечки образуются мыльные пузыри;
- по запаху: характерный запах, которым обладает газ, становится сильнее вблизи места утечки;
- на слух: в случае сильной утечки газ вырывается со свистом.



При возникновении огня на баллоне с газом:

- Вызовите спасателей, газовую аварийную службу, медиков.
- Попробуйте закрыть кран подачи газа, обернув руки мокрым полотенцем. Если это невозможно - не задувайте пламя - возможен взрыв.
- Не пытайтесь выносить или переставлять куда-либо баллон со сжатым газом, пока он не охладился: от встряски он может взорваться.
- Если не удалось справиться с возгоранием, срочно покиньте помещение.



Почувствовав запах газа в квартире:

1. Немедленно проверьте, выключены ли газовые конфорки.
2. Проветрите помещение.
3. Сообщите по телефонам экстренных служб ГП «Республиканский оператор связи» «Феникс» в Службу газа - «104», МЧС ДНР- «101», Скорую помощь - «103».
4. Не пользуйтесь электроприборами.
5. Покиньте квартиру, проинформируйте о случившемся соседей.

Первая помощь при отравлении бытовым газом, метаном

Признаками отравления бытовым газом, метаном является тяжесть в голове, головокружение, шум в ушах, рвота; покраснение кожи, резкая мышечная слабость, усиление сердцебиения; сонливость. При тяжелом отравлении – потеря сознания, непроизвольное мочеиспускание, побледнение/посинение кожи, поверхностное дыхание, судороги.

Действия по оказанию первой помощи пострадавшему:

Вынести пострадавшего на свежий воздух, уложить его (ноги должны быть выше тела). Расстегнуть одежду, восстановить проходимость дыхательных путей, следя за тем, чтобы не западал язык. Приложите холод к голове. Разотрите тело и грудь, тепло укройте и дайте понюхать нашатырный спирт. Если начнется рвота, поверните пострадавшего на бок.

В случае остановки или замедления дыхания (до 8 вдохов в минуту) начинайте искусственную вентиляцию легких. Чтобы самому не отравиться, «вдох» делайте через мокрую марлю (носовой платок), а при выдохе пострадавшего отклоняйтесь в сторону. При улучшении состояния пострадавшего – дайте ему обильное питье (чай, молоко, кефир).

ПОМНИТЕ! ГАЗОВОЕ ОБЛАКО ВЗРЫВООПАСНО!

Неправильное или неосторожное обращение с бытовым газом может привести к трагическим последствиям!

